

Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombózis profilaxis, poszthromboticus szindróma, győgyult lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszületett vagy szerzett krónikus nyirokóköma aktív ödéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelése.

4/2009 EUM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombozís profilaxis, posztthrombotikus szindróma, gyógyult lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, vesezsúratelt vagy szerzett krónikus nyírókódéma aktív ódéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelése.

4/2009 EUM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombotikus profilaxis, posztthromboticus szindróma, gyűjtött lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, vélyszületett vagy szerzett krónikus nyirokódéma aktív odéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelésre.

4/2009 EüM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus thrombózis profilaxis, postthromboticus szindróma, gyűjtött lábszárfelek fenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszületett vagy szerzett krónikus nyirokódéma aktív ödéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelésre.

4/2009 EUM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombfókusz profilaxis, postthromboticus szindróma, gyógyult lábszárfejek fenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszületett vagy szerzett krónikus nyirokódéma aktív ödéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelése.

4/2009 EüM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.




Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombózis profilaxis, posztthromboticus szindróma, gyógyult lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszületett vagy szerzett krónikus nyirokódéma aktív ödéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelésre.

4/2009. EüM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombózis profilaxis, postthromboticus szindróma, gyógyult lábszárfelek fenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszületett vagy szerzett krónikus nyirokódéma aktív odéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelése.

4/2009 EÜM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombozisz profilaxis, posztthromboticus szindróma, gyűlyt lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, vélyszűlet vagy szerzett krónikus nyírókódéma aktív ódéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelésre.

4/2009 EÜM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombózis profilaxis, posztthromboticus szindróma, gyűjtült lábszárfelekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, vélyzületett vagy szerzett krónikus nyírókódéma aktív ödéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelésre.

4/2009 EÜM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombózis profilaxis, postthromboticus szindróma, gyűjtött lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszületett vagy szerzett krónikus nyirokódéma aktív odéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelésre.

4/2009 EUM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus v. elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechaniku tromboziss profilaxis, postthromboticus szindróma, gyógy lábszárfeleképfenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszült vagy szerzett krónikus nyírókódéma aktív ödéma-mentes kezelése után fenntartó kezelésre.

4/2009 EÜM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus v. elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechaniku trombotikus profilaxis, postthromboticus szindróma, gyógy lábszárfelekély fenntartó kezelése, angiodysplesia, vesezúlvagy szerzett krónikus nyirokódéma aktiv ödéma-mentési kezelése után fenntartó kezelésre.

4/2009 EÜM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus v. elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombozissal profilaxis, postthromboticus szindróma, gyógyg lábszárfelekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, veseűl vagy szerzett krónikus nyiroködéma aktív ödéma-mentesí kezelése után fenntartó kezelésre.

4/2009 EUM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus v. elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombózis profilaxis, postthromboticus szindróma, gyógy. lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszü. vagy szerzett krónikus nyirokóráma aktív ödéma-mentési kezelése után fenntartó kezelésre.

4/2009 EÜM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.



Alkalmazás: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus w
elégtelenség, kiterjedt alsővégtagi varicositas, mechanikus
trombózis profilaxis, postthromboticus szindróma, gyógy
lábszárfelekély fenntartó kezelése, angiodysplesia, veleszül
vagy szerzett krónikus nyirokódéma aktív ödéma-mentési
kezelése után fenntartó kezelésre.

4/2009 EUM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai termék.